ENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS MONOAMINÉRGICO E GABAÉRGICO NO EFEITO TIPO-ANSIOLÍTICO AGUDO DO PLUMIERÍDEO

Ana P. Dalmagro^{1,2*}, Anderson Camargo², Priscila L. Zimath¹, Tiago José Bonomini¹, Ana L. B. Zeni², Angela Malheiros¹, Márcia M. de Souza¹

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade do Vale do Itajaí, SC, Brasil. *anap.dalmagro@gmail.com

²Laboratório de Avaliação de Substâncias Bioativas, Universidade Regional de Blumenau, SC, Brasil

INTRODUÇÃO

O transtorno de humor mais prevalente no Brasil é a ansiedade, atingindo 9,3% da população. Fármacos disponíveis para tratar essa patologia apresentam importantes efeitos colaterais, contribuindo para uma baixa adesão ao tratamento. Nosso grupo de pesquisa tem investigado o efeito tipo-ansiolítico do plumierídeo, mas não há informações disponíveis sobre seu mecanismo de ação farmacológico. À vista do exposto, a presente pesquisa objetivou averiguar o envolvimento dos sistemas monoaminérgico e GABAérgico no efeito tipo-ansiolítico do plumierídeo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os procedimentos foram aprovados pelo parecer 024/2018 – CEUA/FURB. Utilizou-se camundongos *Swiss* machos, com idade entre 60-90 dias, água e ração *ad libitum*. Os grupos (n=7-8) foram configurados genericamente como: controle (água), antagonista, PLU 2 µg/kg, antagonista + PLU. A administração dos animais com água e PLU 2 µg/kg ocorreu 60 minutos antes do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e Teste do Campo aberto (TCA) por gavagem; já os antagonistas foram administrados por via i.p., 30 minutos antes dos testes. Foram testados os seguintes antagonistas para os sistemas noradrenérgico: iombina e prazosina (1 mg/kg); dopaminérgico: SCH-23390 e pimozide (0,5 mg/kg); serotoninérgico: ondansetrona e NAN-190 (0,3 mg/kg); GABAérgico: baclofeno (2 mg/kg), bicuculina (1 mg/kg). Aplicou-se a análise de variância ANOVA duas vias

aos dados obtidos, seguida pelo *post-hoc* de Tukey. Foram considerados significativos os resultados com $p < 0,05$.

RESULTADOS

O pré-tratamento dos camundongos com os antagonistas noradrenérgicos α_1 e α_2 (prazosina e iombina) foi capaz de reverter o efeito ansiolítico do plumierídeo ($p < 0,0001$). Com relação ao sistema dopaminérgico, apenas o pré-tratamento com pimozide (D2) foi capaz de reverter o efeito ansiolítico do PLU ($p < 0,0001$). O iridoide também se mostrou dependente dos receptores 5-HT₃ e 5-HT_{1A} para seu efeito ansiolítico ($p < 0,0001$). Os receptores GABA_A e GABA_B, quando antagonizados, também comprometeram o efeito tipo-ansiolítico do PLU ($p < 0,0001$) após administração aguda. Nenhum dos tratamentos interferiu na capacidade locomotora dos animais (TCA- $p > 0,05$).

CONCLUSÕES

Os ensaios preliminares mostram que o efeito agudo tipo-ansiolítico do plumierídeo parece ser dependente da interação com receptores α_1 , α_2 , D2, 5-HT₃, 5-HT_{1A}, GABA_A e GABA_B. Devido à complexidade dos eventos envolvidos no tratamento da ansiedade, sugere-se a continuidade dos estudos sobre o mecanismo de ação farmacológico do plumierídeo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, UNIVALI e FURB.